تقييم بعض العناصر الثقيلة في غبار العواصف الترابية

إسماعيل خليل الهيتي
أحمد صبحي يحيى
جامعة الانبار - كلية العلوم

الخلاصة:

أظهرت نتائج تحليل نماذج تراب العواصف الترابية على ارتفاعات مختلفة من سطح الأرض 6 م، 3 م، وعند سطح الارض وجود تراكيز عالية نسبيا من العناصر الثقيلة في منطقة الرورار في مدينة الرمادي بعد هبوب عاصفة ترابية حمراء قادمة من خارج العراق في 22 آذار 2012، وارتفاع درجة الحرارة في 7 تموز 2012 التي زادت من اندفاع التراب المتصاعد والغبار العالق رأسياً إلى الأعلى مقارنة بالقيم الوطنية في درجات الحرارة المنخفضة في 26 أيلول 2012 وانعدام العواصف الترابية وأظهرت ثلاثة مقاييس للتلوث البيئي بصورة عامة سلامة البيئة من التلوث بمعظم هذه العناصر عدا الكوبلت والكاديميوم التي أبدت توتنا واطنا أو متوسطاً والذي يخشى منه في حدوث التسمم والأمراض المزمنة للسكان.

كلمات مفتاحية : العناصر الثقيلة، العواصف الترابية، الغبار المتصاعد، الغبار العالق، التلوث البيئي.

المقدمة

تمتثل في تباين كبير في درجة الحرارة مع سرعة عالية في الرياح وتكرار سنوات الجفاف⁽⁴⁾. وللترية دور أساسي في نشوء و حركة العواصف الترابية لكونها المادة الأساس لهذه العواصف فإذا تحركت الرياح فوق مسطح مائي فإنها سوف تكتسب خصائص لهذا السطح من رطوبة وما إلى ذلك أما إذا تحركت فوق ارض جرداء ذات تربة مفككة مع تباين في حجم دقائق التربة بوجود سرعة رياح عالية فوقها يؤدي ذلك إلى نقل الدقائق المفككة إلى مكان آخر حسب سرعة الرياح واستمراريتها⁽⁵⁾. تساهم درجات الحرارة في نشوء العواصف الترابية وأشكالها من خلال تحرك الهواء رأسياً بصورة ذاتية من سطح الأرض إلى الأعلى ليحل محله هواء ابرد منه وهذا يعزى إلى التسخين الشديد في سطح الأرض فيتمدد الهواء بارتفاع حرارته ويصعد نحو الأعلى على شكل تيارات صاعدة تعرف بتيارات الحمل التي تبلغ أشدها عندما تصل درجة حرارة الأرض أقصاها⁽⁶⁾. وعندئذ تتكون دوامات حرارية تعمل على رفع الغبار وذرات التربة الجافة إلى الأعلى⁽⁷⁾. لذا فهناك علاقة طردية بين درجة الحرارة والعواصف الترابية وأشكالها. وبإيجاز فان اثر الحرارة في حدوث العواصف الترابية وأشكالها تتمثل في المداد والديمومة لنشوء العواصف الترابية وحدثت ظاهرتي الغبار المتصاعد والغبار العالق إضافة إلى حدوث ظاهرة الفتالة

العواصف الترابية غيمة من الاتربة يقل مدى الرؤية فيها عن كيلو متر واحد مع سرعة رياح تصل 7 م/ثا او اكثر وتتفاوت العواصف الترابية في شدتها وحجمها وكثافتها وارتفاعها الذي يتراوح بين 1-550 م والمسافات التي تقطعها تتراوح بين عشرات إلى آلاف الكيلومترات قاطعة بذلك ومنقلة عبر القارات ولها القابلية على حمل كميات كبيرة من الغبار تصل 4000 طن/ ميل⁽¹⁾. ومن الأمثلة على ذلك ارتفاع شريط من الرمال الحمراء من صحراء النفوذ في المملكة العربية السعودية في طرفه الشرقي يمتد نحو الجنوب مكونا قوسا متجها إلى الشرق يعرف بصحراء الدهناء أو النفوذ الصغرى تمتد نحو 1300 كم حتى تنتهي إلى رمال الربع الخالي ويتراوح اتساعها بين 25-80 كم ومتوسط ارتفاعها 450 م فوق مستوى سطح البحر⁽²⁾.

تعتبر الرياح منظما أساسيا للغلاف الجوي حيث تكون سببا لحدوث ظواهر جوية كثيرة كالغيوم والأمطار والعواصف الترابية وانها عامل مهم في نقل الحرارة والرطوبة⁽³⁾. ومن أهم العوامل المؤثرة على حركة العواصف الترابية واستمراريتها وجود أراض صحراوية واسعة مسطحة وقلة النبات الطبيعي الذي يساهم في تماسك التربة إضافة إلى وجود مناخ قاس

السليكا التي تتميز بدقة جسيماتها. لذا إذا وصلت كثافة ذرات الرمل في الهواء الملوث إلى خمسة ملايين ذرة سليكا لكل قدم مكعب من الهواء فإن 25% من هذه الذرات تستقر داخل الرئتين والقصبية الهوائية بعد استنشاقها. إن تعرض الإنسان لهذه المواد لمدة طويلة قد يصاب بمرض التدرن الرئوي. كما تتزايد احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والتهاب العيون والجلد واللوزتين⁽¹³⁾.

مما تقدم يتبين التأثير السلبي للعواصف الترابية على حياة الإنسان وبيئته التي يعيش فيها لذا ولدت فكرة تحليل تراب العواصف الترابية للوقوف على مكوناتها وخاصة العناصر الثقيلة المسببة للأمراض المزمنة ومعرفة المدى الذي وصلت إليه تراكيز تلك العناصر وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على حياة الإنسان وبيئته في منطقة الرور المأهولة بالسكان والقريبة من الشارع العام في مدينة الرمادي في محافظة الانبار - العراق.

الجزء العملي

النمذجة

جمعت النماذج الترابية من ارتفاعات مختلفة من سطح الأرض ارتفاع 6 امتار من سطح الأرض، ارتفاع 3 امتار من سطح الأرض، سطح الأرض وخلال فترات زمنية مختلفة من السنة وكالاتي 22 آذار 2012 و 7 تموز 2012 و 26 أيلول 2012 .

تحضير النماذج للهضم

جففت العينات بدرجة حرارة 104م° لمدة 12 ساعة بعدها فصلت حسب حجوم الحبيبات. أخذت الحجوم الأقل من 106 مايكرومتر لإجراء الهضم عليها⁽¹⁴⁾.

هضم النماذج بالمايكرومتر

وزن 1 غم في وعاء نظيف وجاف من النموذج الجاف وأضيف له 25 مل من مزيج الحوامض المركزة (HCl:H₂SO₄:HNO₃) بالنسب (3:2:2) وحرك المزيج مع النموذج لحين التجانس. بعدها وضع في المايكرومتر حيث ثبتت الطاقة 1050 واط و درجة الحرارة 190م° والزمن 30 دقيقة. وبعد اكتمال زمن الهضم و ترك وعاء الهضم ليبرد يتم نقل النموذج الى قنينة حجمية سعة 50 مل بعد ترشيحه ثم يغسل المتبقي من النموذج في الوعاء بأقل كمية من الماء المقطر لعدة مرات لحين التأكد من نزول جميع النموذج ويرشح ثم يكمل الحجم الى 50 مل بالماء المقطر⁽¹⁵⁾.

(Dust Devil)⁽⁸⁾. وتكتسب الكتل الهوائية التي هي حجم ضخم من الهواء خصائصها العامة في المنطقة الأرضية التي تتشكل فوقها (سهل منبسط أو هضبة متسعة) وتعزى اغلب التغيرات اليومية في أحوال الطقس إلى حركة الكتل الهوائية. وخاصة في مناطق التقاء هذه الكتل⁽⁹⁾. يحدث الغبار المتصاعد والغبار العالق في المنطقة المحلية نفسها والمناطق الصحراوية القريبة سواء كانت قطرية أو إقليمية. أما العواصف الترابية فمصادرها القريبة (صحراء الجزيرة العربية) والبعيدة (الصحراء الأفريقية). وقد تحدث العواصف الترابية حتى في السنوات الممطرة المتتالية إذ يكون مصدرها خارجيا من الصحاري المجاورة لمنطقة الدراسة ذات الطبيعة الجافة لكن تخف حدتها فوق المنطقة التي نمت فيها الحياة النباتية وتماسكت تربتها بعض الشيء بسبب الأمطار⁽¹⁰⁾. تساهم العواصف الترابية وأشكالها وقت حدوثها وبعد انتهائها بفترة يوم أو أكثر بجملة من التأثيرات السلبية التي تظهر على سلوك الإنسان ونشاطه يبدأ من الشعور بالضيق وعدم الارتياح وتنتهي في بعض الأحيان إلى أمراض خطيرة تسبب الموت إذا لم يتم إسعاف المصاب بالسرعة المطلوبة فضلا عن تأثيرات أخرى تتلخص بالتأخر أو التوقف عن العمل ووقوع الحوادث المرورية والإضرار بالممتلكات المنزلية والمهنية والأضرار التي تصيب المحاصيل الزراعية وزيادة نسبة الاستهلاك المائي مقارنة بالأيام العادية ومن ثم الأضرار الصحية التي تصيب الإنسان بسبب هذه الظاهرة⁽¹¹⁾. تؤدي العواصف الترابية وما تحمله من مواد عضوية وغير عضوية وبتراكيز عال إلى إصابة الإنسان بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون وأمراض الجلد. تقاس مكونات العاصفة الترابية بالمايكرومتر 10⁶-10 متر واهتمت الدراسات بالدقائق التي يقل قطرها عن 2.5 مايكرومتر والتي يمكنها اختراق الجهاز التنفسي بعد أن يحملها الهواء مسافات بعيدة أما الدقائق الكبيرة التي يزيد قطرها عن 2.5-5 مايكرومتر فإنها تعلق أو تعاق في الجهاز التنفسي العلوي أما الدقائق التي يزيد قطرها عن 5 مايكرومتر فتكبح من قبل الشعيرات الدموية وتطرح خارج الجهاز التنفسي. أما دقائق الغبار التي يبلغ قطرها مايكرومتر واحد فإنها تدخل الرئة وتستقر فيها أياما أو أسابيع وبعض الأحيان سنين مسببة حالات مرضية مزمنة في الجهاز التنفسي ومحدثة ضررا في الجهاز المناعي والدفاعي للإنسان⁽¹²⁾. وأشارت دراسات التحليل الكيميائي والحبيبي لعينات الغبار في مدينة الرصيفة في الأردن أن 11.1% من هذه العينات تصل أقطار دقائقها إلى 5 مايكرومتر كما تبين وجود مواد شديدة الصلابة من

مقاييس تلوث البيئة بالعناصر الثقيلة

استعين بثلاثة مقاييس لمعرفة مدى تلوث البيئة بالعناصر الثقيلة في التواريخ التي تم فيها الحصول على نماذج تراب العواصف حيث تتوفر علاقات رياضية خاصة بهذه المقاييس تحت منها مستويات خاصة

$$(I_{geo}) = \log_2 \{ C_m / 1.5 * B_n \} \text{ or }^{(16)}$$

$$(I_{geo}) = \ln \{ C_m / 1.5 * B_n \}^{(17)}$$

اذ ان C_m = تركيز العنصر في النموذج

B_n = القيمة المرجعية للعنصر في الطبيعة

قدرت العناصر في محاليل الهضم باستخدام جهاز الامتصاص الذري اللهبى (Phoenix-986) باستخدام لهب (هواء - استنلين) وعلى الأطوال الموجية الآتية:

(Co) (Fe 248.3nm) (Mn 79.5nm) (Cr 357.9nm) (Zn) (Cu 324.8nm) (Ni 232.0nm) (240.7nm) (Pb 217.0nm) (Cd 228.8nm) (213.9nm)

لكل منها. جمعت هذه المستويات من بيانات كثيرة ترتبط بظواهر التلوث ومن هذه البيانات يمكن تقدير مستوى التلوث ان كان واطناً او عالياً او شديداً.

1- عامل التراكم الارضى Geo-accumulation Index (I_{geo})

ان هذا المقياس يبين مستوى التلوث بالعنصر في المنطقة والجدول (1) يبين مستويات هذا المقياس لبيان حالة التلوث ويمكن حساب قيم (I_{geo}) من المعادلات الآتية .

جدول (1) : مستويات (I _{geo}) لبيان حالة التلوث		
I _{geo} قيمة	المستوى	مستوى التلوث الناتج
0 ≥	0	لا يوجد تلوث
0 - 1	1	لا يوجد تلوث - تلوث متوسط
1 - 2	2	تلوث متوسط
2 - 3	3	تلوث متوسط - تلوث عالي
3 - 4	4	تلوث عالي
4 - 5	5	تلوث عالي - تلوث شديد
>6	6	تلوث شديد

3- عامل حمل التلوث Pollution Load Index (PLI)

اما هذا المقياس فهو يقيم حالة التلوث بجميع العناصر في المنطقة .

حالة التلوث وتحسب قيمته من المعادلة الآتية:

$$PLI = (CF_1 \times CF_2 \times \dots \times CF_n)^{1/n} \text{ (16)}$$

اذ ان n = العنصر

2- عامل التلوث Contamination Factor (CF)

ان هذا المقياس يبين مستوى التلوث بالعنصر في المنطقة والجدول (2) يبين مستويات هذا المقياس لبيان حالة التلوث وتحسب قيمته من المعادلة الآتية.

$$CF = C_m / B_n \text{ (18)}$$

اذ ان C_m = تركيز العنصر في النموذج

B_n = القيمة المرجعية للعنصر في الطبيعة

جدول (2): مستويات (CF) لبيان حالة التلوث	
CF قيمة	ة التلوث
CF < 1	تلوث واطنى
1 ≤ CF < 3	تلوث متوسط
3 ≤ CF < 6	تلوث عالي
CF > 6	تلوث عالي جدا

تكون قادمة من المملكة العربية السعودية (2) او الصحراء الافريقية (10) اذ ان مصدرها خارجي من الصحاري التي تكثر فيها هذه الرمال الحمراء نتيجة لحصول تيارات الحمل التي تبلغ أشدها عندما تصل درجة الحرارة اقصاها (6).

النتائج والمناقشة

يلاحظ من الجدول (4) زيادة تراكيز العناصر الثقيلة بازدياد الارتفاع عن سطح الارض مع بعض الشواذ (الكروم، الرصاص والكادميوم) أخذت هذه النماذج في يوم عاصف بتاريخ 2012|3|22 سادته عاصفة ترابية حمراء والتي قد

جدول (4) : تراكيز العناصر بوحدة ملغم/كغم للرواسب الجوية في (2012/3/22)

العنصر	سطح الارض	ارتفاع 3 امتار	ارتفاع 6 امتار	المعدل
Cr	13.85	12.15	11.05	12.35
Co	25.65	30.7	36.45	30.93
Pb	17.35	13.75	16.15	15.75
Fe	384.8	594.45	709.1	562.78
Ni	14.85	14.05	15.75	14.88
Cu	2.8	2.7	3.25	2.91
Zn	8.5	8.4	9.95	8.95
Cd	1.55	0.95	1.15	1.21
Mn	32.1	27.7	33.75	31.18

والغبار العالق اضافة الى حدوث ظاهرة الفتالة⁽⁶⁾. ولقد ساهمت درجات الحرارة العالية في الشهر الذي جمعت فيه هذه النماذج وهو شهر تموز 2012|7|7 والذي تجاوزت فيه درجة الحرارة 50 °م، على نشوء العواصف الترابية واشكالها من خلال التحرك الرأسي او العمودي من سطح الارض ليحل محله هواء ابرد منه والذي يعزى الى التسخين الشديد على سطح الارض مما ادى الى تمدد الهواء بارتفاع درجة حرارته وصعوده نحو الاعلى على شكل تيارات صاعدة تعرف بتيارات الحمل⁽⁶⁾. وعندئذ تتكون دوامات حرارية تعمل على رفع الغبار وذرات التربة الجافة الى الاعلى⁽⁷⁾، لذا فتوجد علاقة طردية بين درجة الحرارة والعواصف الترابية واشكالها. يحدث الغبار المتصاعد والغبار العالق في المنطقة المحلية نفسها والمناطق الصحراوية القريبة سواء كانت قطرية او اقليمية⁽⁹⁾.

فتعبر هذه العواصف الترابية القارات والبحار وعند وصولها فوق العراق حدث ذلك المنخفض الجوي الذي ادى الى نزول العاصفة الترابية الحمراء من الاعلى الى الاسفل لذا نجد ان تراكيز العناصر قد انخفض من الاعلى الاسفل متماشياً مع النقاء هذه العواصف الترابية الحمراء مع السطوح التي سقطت عليها. وقد عززت ذلك النسب العالية للحديد في ارتفاع 6 امتار و3 امتار مقارنة بسطح الارض. بما يثبت سقوط التراب الاحمر من الاعلى الى الاسفل وان اللون الاحمر البني يعزى الى اوكسيد الحديد (III) (Fe_2O_3) وهو خام الحديد ويدعى الهيماتايت ($Fe_2O_3 \cdot XH_2O$) وباستعراض النتائج المدونة في الجدول(5) يلاحظ تقريبا نفس النمط في تراكيز العناصر الثقيلة بزيادتها من سطح الارض الى السطوح الاعلى ارتفاع 6 و3 امتار الا انه يلاحظ انخفاض كبير في تراكيز هذه العناصر مما يدل على ان هذه العواصف الترابية تتمثل في حدوث ظاهرتي الغبار المتصاعد

جدول (5): تراكيز العناصر بوحدة ملغم/كغم للرواسب الجوية في (2012/7/7)

العنصر	سطح الارض	ارتفاع 3 امتار	ارتفاع 6 امتار	المعدل
Cr	12.05	12.45	13.25	12.58
Co	4.1	4.35	4.45	4.3
Pb	4.7	4.8	5.35	4.95
Fe	236.88	263.43	258.28	252.86
Ni	13.45	15.8	16.4	15.21
Cu	2.85	2.9	3.15	2.96
Zn	6.3	6.55	8.6	7.15
Cd	0.6	0.7	0.75	0.68
Mn	38.95	38.7	51.2	42.95

2012/9/26 جدول (6) اذا انخفضت درجة الحرارة مقارنة بدرجة حرارة شهر تموز 2012/7/7 ولم تحصل عاصفة ترابية حمراء إضافة الى قلة أو انخفاض الغبار المتصاعد والغبار العالق. وعندئذ يلاحظ الانخفاض في تراكيز العناصر الثقيلة صعوداً من سطح الارض الى الارتفاعات الاعلى مقارنة بالتراكيز التي تم الحصول عليها بتاريخ 2012/3/22 وتاريخ 2012/7/7.

لم تكن التراكيز التي حصل عليها في 2012/7/7 بمستوى التراكيز التي حصل عليها في 2012/3/22 حيث انخفضت في 2012/7/7 الى الثلث في ارتفاع 6 امتار والى النصف في ارتفاع 3 امتار وسطح الارض ويمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة بالنسبة للحديد مقارنة بالتراكيز العالية التي حصل عليها من العاصفة الترابية الحمراء التي وقعت في 2012/3/22. يلاحظ الانخفاض الكبير والواضح في تراكيز العناصر الثقيلة عند تحليل الغبار الذي تم جمعه في

جدول (6): تراكيز العناصر بوحدة ملغم/كغم للرواسب الجوية في (2012/9/26)

العنصر	سطح الارض	ارتفاع 3 امتار	ارتفاع 6 امتار	المعدل
Cr	13.75	13.05	8.65	11.81
Co	3.5	4	4	3.83
Pb	5.05	5.15	7.2	5.8
Fe	254.69	259.37	151.94	222
Ni	15.2	16.5	16.05	15.91
Cu	2.6	3.25	2.8	2.88
Zn	10.8	7.55	6.45	8.26
Cd	0.75	0.7	0.65	0.7
Mn	50.6	29.45	28.75	36.26

وباستعراض الجدول (7) يلاحظ ان معظم عوامل التراكم الارضي (Igeo) سالبة اي اقل من الصفر فلا يوجد تلوث للبيئة بهذه العناصر الثقيلة التي تبدي قيما اقل من الصفر حسب مقياس عامل التراكم الارضي والذي يبين الجدول (1) مستوياته التي تحدد مستويات التلوث البيئي. يستثنى من

جدول (7) : قيم (Igeo) للعناصر الثقيلة خلال الفترات التي جمعت فيها النماذج

العنصر	تاريخ اخذ النموذج			القيمة المرجعية ملغم/كغم
	2012/3/22	2012/7/7	2012/9/26	
Cr	0.127	0.129	0.121	97
Co	1.546	0.215	0.191	20
Pb	0.787	0.247	0.29	20
Fe	0.562	0.252	0.222	1000
Ni	0.303	0.310	0.324	49
Cu	0.091	0.092	0.090	32
Zn	0.069	0.055	0.064	129
Cd	6.083	3.416	3.5	0.2
Mn	0.043	0.059	0.050	720
PLI	0.331	0.205	0.202	

من العناصر الثقيلة لذا يجب الحذر واتخاذ وسائل الوقاية اللازمة عند حدوث العواصف الترابية خشية التسمم بهذه العناصر او الاصابة بالامراض المزمنة⁽¹³⁾.

كذلك اظهرت نتائج التحليل تراكيز العناصر على ارتفاع 6 أمتار و 3 أمتار أكثر من سطح الارض يوم وقوع العاصفة الترابية الحمراء القادمة من خارج القطر في 2012|3|22 وارتفاع درجة الحرارة في 2012|7|7 التي تزيد من اندفاع التراب المتصاعد والغبار العالق رأسياً الى الاعلى مقارنة بالقيم الواطئة في درجات الحرارة المنخفضة في 2012|9|26.

اظهرت الثلاثة مقاييس للتلوث البيئي بصورة عامة سلامة البيئة من التلوث بهذه العناصر عدا عناصر الكوبلت والكاميوم التي أبدت تلوثاً واطناً أو متوسطاً والتي يخشى منها في حدوث التسمم والامراض المزمنة.

يلاحظ من الجدول (8) ان تنظيم عوامل التلوث للعناصر الثقيلة اقل من 1 فالتلوث واطيء حسب مقياس عامل التلوث والذي مستوياته لتقييم حالة التلوث مبينة في الجدول (2). يستثنى من ذلك عنصر الكوبلت الذي أبدى تلوثاً متوسطاً (اكبر اواقل من 3) في تراب العاصفة الترابية بتاريخ 2013|3|22 اما عنصر الكادميوم فيستننتج من عوامل تلوثه انه يبدي تلوثاً عالياً جداً في عاصفة 2012|3|22. اما في تاريخ 2012|7|7 و 2012|9|26 فأبدى الكادميوم تلوثاً عالياً. واستنادا الى قيم PLI المدونة في الجدول (8) والتي كانت في جميع فترات جمع النماذج اقل من 1 فان هذه القيم تشير الى عدم وجود تلوث بهذه العناصر الثقيلة حسب هذا المقياس والجدول (3) يبين مستوياته لتقييم حالة التلوث.

الاستنتاجات

أظهرت نتائج تحليل نماذج تراب العواصف الترابية على ارتفاعات مختلفة من سطح الارض وجود تراكيز عالية نسبياً

الجدول (8) : قيم (CF) للعناصر الثقيلة خلال الفترات التي جمعت فيها النماذج مع قيم (PLI) لكل فترة				
العنصر	تاريخ اخذ النموذج			القيمة المرجعية ملغم/كغم
	2012/3/22	2012/7/7	2012/9/26	
Cr	-2.466	-2.447	-2.510	97
Co	0.030	-1.942	-2.057	20
Pb	-0.644	-1.801	-1.643	20
Fe	-0.980	-1.780	-1.910	1000
Ni	-1.597	-1.574	-1.529	49
Cu	-2.800	-2.783	-2.812	32
Zn	-3.073	-3.298	-3.153	129
Cd	1.400	0.823	0.847	0.2
Mn	-3.544	-3.224	-3.393	720

our Environment " An Overview in T.A. Moore, A. Black, J.A. Centeno, J.S. Harding, D. A. Trumm (ed.), Metal Contaminants in New Zealand, Resolutionz Press, Christchurch, New Zealand, 25-46, (2005).

- 14 - S. Mitra " Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry " Department of Chemistry and Environmental Science ,New Jersey Institute of Technology, Vol.162: 17-28,234-235,(2003).
- 15 - M. Erdogan " Monitoring and Statistical Assessment of Heavy Metal Pollution in Sediments Along Izmir Bay Using ICP-MS " Doctor of Philosophy in Chemistry, (2009).
- 16- K.B. Mmolawa , A.S. Likuku and G.K. Gaboutloeloe " Assessment of heavy metal pollution in soils along major roadside areas in Botswana " Environmental Science and Technology Vol.5(3);:186-196,(2011).
- 17- A.I Mahsn , Y. Faleh and A.H Najim " Seasonal variation and assessment of heavy metal pollution in sediments from selected stations in Tigris and Euphrates , central Iraq " Iraqi journal of sciencn, Vol.50, No.4,:466-475,(2009).
- 18- P.K.Saha and M.D.Hossain " Assessment of heavy metal contamination and sediment quality in the Buriganga river , Bangladesh " Environmental Science and Technology Vol.6:384-388,(2011).

المصادر

- 1- N. S. Arthur , and H. S. Alan , " Introduction to Environmental Science " John Wiley and Sons , Inc. , USA , p:413 , (1974) .
- 2 - السماك ، محمد أزهر سعيد و الجنابي ، هاشم خضير " جغرافية الوطن العربي " الصفحة : 40 ، (1985) .
- 3 - محمد ، وسن و بزون و قاسم تين " تأثير الظروف الطبيعية والمناخية على اجراف التربة " وزارة البيئة ، قسم الصحاري والاراضي الزراعية ، الصفحة : 41 ، (2006) .
- 4 - حمزة ، نوري محسن و الشيباني و شيبان " جيومورفولوجية منطقة عنه " المؤتمر الجغرافي الاول ، التصحر واثره على التنمية الاقليمية في محافظة الانبار ، الصفحة : 5 ، (1993) .
- 5-مواحة ، حكم عبد الجبار مصطفي " الجيولوجيا العامة " ط ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، جامعة اليرموك ، عمان ، الصفحة : 73 ، (2005) .
- 6- موسى و علي حسين " اساسيات علم المناخ " ط ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، الصفحة : 38 ، (1994) .
- 7- البيطي و داود ناصر " العواصف الترابية والغبار في العراق " الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية ، مركز تدريب الانواء الاقليمي ، الصفحة : 2 ، (1984) .
- 8- محمد و ماجد السيد ولي " العواصف الترابية في العراق واحوالها " مجلة الجمعية الجغرافية ، مجلد 13 ، الصفحة : 74 ، (1982) .
- 9- موسى و صلاح بشير " المناخ التطبيقي " المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، الصفحة : 179 ، (2005) .
- 10- السامرائي قصي عبد المجيد " المناخ والاقاليم المناخية " الطبعة العربية ، دار البيازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الاردن ، الصفحة : 115 ، (2008) .
- 11- النفاش عدنان باقر و الدرجي و سعد عجيل مبارك " التأثيرات البيئية للعمليات الريحية في العراق " مؤتمر التصحر في الوطن العربي ، الاردن ، الصفحة : 504 ، (1999) .
- 12- سالم واحمد " الامراض الصدرية وطب النوم " المركز الجامعي لطب وابلحث النوم ، كلية الطب - جامعة الملك سعود - السعودية ، (2010) . شبكة المعلومات العالمية <http://knol.google.com> .
- 13-R.B. Finkelman " Sources and Health Effects of Metals and Trace

ASSESSMENT OF SOME HEAVY METALS IN THE DUST OF DUSTY STORMS

ISMAIL K. AL- HITTI AHMAD S. YAHYA
E.mail: dean_coll.science@uoanbar.edu.iq

ABSTRACT

The analysis of dust storms samples at different heights above earth surface have shown relatively high concentrations of heavy metals than earth surface in Warrar Region of Ramadi city . These high levels were obtained on 22 nd April, 2012 as a result of Reddish Dust Storm has blown from outside of Iraq, and as a result of high temperatures on 7th July, 2012 which increased ascending and suspending dusts compared with the low levels obtained at lower temperatures on 26th September , 2012 and the absence of the dust storms. Three scales of environmental pollution have confirmed, generally, no contamination with most of these heavy metals. However (Cobalt and Cadmium) have shown low or medium pollution which should be taken into consideration to avoid poisoning and chronic diseases to the inhabitants.