

## دراسة بايولوجية جزيئية لعامل الضراوة الهيمولايسين لبكتريا *E. Coli* المعزولة من خمج المجاري البولية للمرضى في مستشفى الرمادي التعليمي

حسن هلال رشيد      ليث مصلح نجيب  
جامعة الانبار / كلية العلوم

### الخلاصة

أجريت هذه الدراسة لعزل وتشخيص بكتريا *E. coli* المسببة لخمج المجاري البولية مع دراسة عامل الضراوة الهيمولايسين جزيئياً في العزلات الأكثر مقاومة للمضادات الحيوية. شملت الدراسة 200 عينة بول من المرضى الراقدين والمراجعين لمستشفى الرمادي التعليمي من الاناث والذكور وبأعمار مختلفة اعتباراً من (1) سنة ولغاية (70) سنة حصلنا فيها على 106 عزلة من بكتريا *E. coli* بنسبة 59%. عند اجراء فحص الحساسية لهذه العزلات أظهرت مقاومة عالية اتجاه المضادات الحيوية - Nalidicacid - Gentamicin - Cefotaxime وبنسبة 100% - 97.2% - 95.3% على التوالي. تمت دراسة عامل الضراوة HyLA اتجاه (10) من العزلات الأكثر مقاومة بعد ان تم اسخلاص الدنا الكروموسومي والبلازميدي بواسطة الترحيل الكهربائي. أظهرت النتائج وجود عزلة واحدة حاملة للجين HyA وهي العزلة رقم (7) لعينات الدنا الجينومي فيما بينت النتائج وجود الجين في العينات 3 ، 6 ، 7.

كلمات مفتاحية: هيمولايسين ، *E. Coli* ، خمج المجاري البولية ، مستشفى الرمادي التعليمي

### المقدمة

للهمولايسين، أما الـ 50 % الاخرى فتكون منتجة للهمولايسين بمجرد ترسخها في القناة البولية(5). تمتلك البكتريا عدة آليات مقاومة للمضادات الحيوية ، منها المقاومة الطبيعية المسؤولة عن منع عمل المضادات الحيوية من خلال فشل أو عدم قدرة المضاد للوصول الى هدفه بسبب الصفات التركيبية والتشريحية للكائن الحي والتي تحول دون تفاعل المضاد مع مراكز تأثيراته الحيوية(6). وقد تكون المقاومة ناتجة بسبب الطفرات الكروموسومية او البلازميدية التي تحمل صفة المقاومة عن طريق الجينات القافزة وهي قطع من جينات الـ DNA لها القدرة على الانتقال من موقع إلى آخر(7) . وقد تكون المقاومة ناتجة عن تغيير في تركيب انزيمات معينة او فقدانها الوظيفة مما يؤدي الى تغييرات سلبية في الموقع الذي يعمل عليه المضاد وقد تكون المقاومة ناتجة عن بناء انزيمات تعمل على ازالة سمية المضادات الحيوية(8). أما مقاومة البكتريا لمضادات البيتا لكتام  $\beta$  Lactam فتأتي من خلال انتاجها لأنزيمات الـ  $\beta$  Lactam التي تعمل على تحليل حلقة البيتا لكتام(9). إن مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية تكمن في قدرتها على البقاء رغم تعرضها للمضادات التي تخترقها البكتريا وتقاومها ، وقد اصبحت هذه المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية ذات الوظائف والهيكلية المتعددة مشكلة كبيرة في الدول النامية من حيث اعباء الامراض المعدية والكائنات الحية الدقيقة تظهر مقاومتها للمضاد بموجب عدم نشاط الدواء وفعاليتها عن

تعتمد امراضية بكتريا الـ *E. coli* الممرضة للمجرى البولي على عدد واسع من محددات الضراوة، إذ تعد اهم جرثومة مسؤولة عن اخماج المجرى البولي وهي عبارة عن مستعمرات منتقاة من الـ Normal Flora تمتلك عوامل ضراوة مختلفة تمكنها من استيطان وغزو القناة البولية واحداث الخمج (1) وتقريباً وفي معظم الحالات تصعد البكتريا الى المثانة عبر الاحليل الطريق الصاعد عندها تستوطن في المثانة وتنتقل الى الكليتين مسببة حدوث التهاب الكلى(2) . تسبب بكتريا الـ *E. coli* اخماج المجاري البولية من خلال امتلاكها عوامل ضراوة تساعد في التكيف والبقاء في المضيف وعوامل الضراوة التي تمتلكها تسمح لها بالهروب من آليات الدفاع في المضيف مثل تدفق الادرار. الازموزية تغير الـ PH وانتاج السايوتوكينات(3) . تنتج معظم سلالات الـ *E. coli* الممرضة للمجرى البولي الهيمولايسين الذي يسهل عملية الغزو للنسيج وتلف الخلايا الظهارية للكلى وحيواناتها(4). تعرف نيفانات الهيمولايسين بأنها بروتينات سامة خارج خلوية تفرز من قبل العديد من الجراثيم السالبة والموجبة لملون كرام. ان الهيمولايسين مصطلح عام يشير الى البروتينات السامة المطللة لكريات الدم الحمر. تنتج بعض عزلات *E. coli* الهيمولايسين خاصة تلك المعزولة من اصابات خارج القناة الهضمية للإنسان إذ وجد ان 50% من هذه العزلات منتجة

الاختبارات اللازمة مع مراعاة تجديدها شهريا وبالطريقة نفسها<sup>(12)</sup>

#### التشخيص

شخصت العينات البكتيرية المعزولة اوليا بملاحظة المستعرات النامية وفق الشكل المختبري للمستعرات من حيث حجم المستعرة وقطرها وارتفاعها ولونها وشكل حافتها. كما تضمن التشخيص عمل مسحات من المستعرات على شرائح زجاجية نظيفة صبغت بصبغة كرام بعد ذلك تم ملاحظة شكل ولون وترتيب الخلايا المصبوغة بواسطة المجهر الضوئي باستخدام العدسة الزيتية وذلك لغرض تشخيص البكتريا كونها سالبة او موجبة لصبغة كرام<sup>(13)</sup> . بعد ذلك تم اجراء الفحوصات الكيماوية وتم استخدام نظام API20E ثم استخدام جهاز Vitek2 لأعطاء التشخيص النهائي.

#### استخلاص الدنا البلازميري

عزل الدنا البلازميري لبكتريا *E. coli* باستخدام العدة المحضرة من شركة بروميكا Pure Yield minpref system

#### استخلاص الدنا الجينومي

عزل الدنا الجينومي لبكتريا *E. coli* باستخدام العدة المحضرة من شركة بروميكا wizard genomic DNA purification

#### الترجيل الكهربائي

بعد اتمام عملية استخلاص الدنا البلازميري والجينومي يتم استخدام تقنية الترحيل الكهربائي للكشف عن نوعية الدنا المستخلص وظهور البلازميدات كما يتم استخدام هذه التقنية ايضاً في الكشف عن نتيجة تضاعف البلمرة المتسلسل.

#### قياس تركيز الدنا

تم قياس تركيز الدنا المستخلص (البلازميدي والجينومي) باستخدام جهاز المطياف الضوئي النانوي NanoDrop حيث يتم اضافة (1) مايكرو ليتر من عينة الدنا الى الجهاز وتعرض نتائج الفحص على شاشة الحاسبة المرتبطة به يتم حساب التركيز والنقاوة اعتمادا على قياس الطيف الضوئي الممتص عند ثلاث درجات وهي 330 و 260 و 280 نانوميتر وعند هذه الدرجات تكون اعلى امتصاصية للدنا والرنا والبروتين على التوالي.

#### البودائ

تم تحضير التفاعل باستخدام بودائ متخصصة تم تصميمها لهذا الغرض. البودائ المجففة تمت اذابتها بالماء الخالي من انزيمات التقطيع للوصول الى التركيز 100 بيكومول لكل مايكروليتر كمحلول خزن. ومن ثم تم تحضير محلول العمل

طريق انتاج الانزيمات ومنع تراكم الدواء في البكتريا وحماية الموقع المستهدف واستخدام مسارات بديلة لمتطلبات النمو<sup>(10)</sup>.

#### طريقة العمل

جمعت عينات الادرار من 200 مريض من الرافدين والمراجعين للعيادة الاستشارية البولية لمستشفى الرمادي التعليمي ومن كلا الجنسين من الذين يعانون من اعراض اخماج القناة البولية وقد تم جمع كافة المعلومات للمرضى المشمولين بالدراسة والمتعلقة بالعمر والجنس ووجود اصابات سابقة ومستوى التعليم والمنطقة السكنية (المدينة او الريف) وفق استمارة خاصة. تم جمع العينات من شهر آذار 2015 لغاية آب 2015 وذلك من الدفق المتوسط للبول وكذلك استعملت القنطرة وارتشاق ادرار المئات وعينة كيس الادرار من المرضى الذين لا يستطيعون التبول وبأستعمال انابيب بلاستيكية معقمة. جرى استعمال الطرق القياسية في معاملة العينات ونقلها وزرعها وحضنها وفحصها من أجل عزل العامل المسبب للخمج وتشخيصه واجراء فحص الحساسية الدوائية<sup>(11)</sup>.

#### الفحص المجهري

تم اجراء الفحص المجهري المباشر لكل عينة قبل اجراء عملية الزرع على الاوساط الزرعية وذلك بأخذ قطرة بول ووضعها على الشريحة وتغطيتها بغطاء الشريحة قبل اجراء الطرد المركزي وفحصها تحت المجهر الضوئي لمشاهدة الخلايا القححية وخلايا البكتريا التي يزيد عددها على  $10^5$  لكل مل من الادرار وكذلك تم اجراء الفحص المجهري بعد عملية الطرد المركزي لجوالي (5 مل) من الادرار بواسطة تيوبوات خاصة سعة (15 مل) ونبد الراشح ثم اخذ قطرة واحدة من الراشب لمشاهدة الخلايا القححية وكل عينة خالية من هذه الخلايا تعد سالبة وتهمل قبل اجراء الزرع.

#### زرع العينات

زرعت عينات منتصف الادرار هوائياً على وسط اكار الدم Blood agar ووسط الماكونكي اكار MacC. Agar باستخدام عروة المعاييرة ثم حضنت الاطباق الزرعية بدرجة 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة. في النتائج الموجبة التي يظهر فيها نمو جرثومي يتم اختيار المستعرات المفردة من الاوساط الزرعية ويعاد زرعها مرة اخرى على اطباق جديدة من الوسط نفسه لحين الحصول على عزلات نقية من تلك البكتريا بعدها يتم نقل هذه المستعرات على وسط الاكار المغذي ويحضان في درجة 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة ثم تحضن في التلاجة بدرجة حرارة 4 درجة مئوية لحين اجراء

بتركيز 10 بيكومول لكل مايكرو ليتر وذلك باضافة 10 مايكرو ليتر من محلول الخزن الى 90 مايكروليتر من الماء.

جدول (1) جين عامل الضراوة *HlyA* الذي تمت دراسته وتسلسل البوادي الخاصة به وحجم القطع الناتجة من التضاعف ودرجة الحرارة المستخدمة في تقنية تضاعف البلمرة التسلسلي.

| Gene | Seq.                      | Size | Tm |
|------|---------------------------|------|----|
| Hly  | AACAAGGATAAGCACTGTTCTGGCT | 1117 | 60 |
|      | TCCATATAAGCGGTCATTCCCGTCA |      |    |

### النتائج والمناقشة:

عزلة بنسبة 12.8 % جدول (2) . وقد لوحظ من خلال الدراسة ان جرثومة الـ *E. coli* كانت من اكثر مسببات لخمج المجاري البولية حيث شكلت نسبة 59% من مجموع العزلات جدول (3) وقد يكون سبب الاصابة العالية بجرثومة الـ *E. coli* عائداً لتواجدها بصورة طبيعية في الجهاز الهضمي للإنسان ومنه تنتقل الى القناة البولية للشخص المصاب.

أظهرت نتائج عزل البكتريا من (200) عينة ادرار من مرضى يعانون من اخماج القناة البولية من المراجعين والراقدين في مستشفى الرمادي التعليمي خلال الفترة الممتدة من شهر آذار 2015 لغاية آب 2015 سيادة البكتريا السالبة لصبغة كرام حيث بلغ عدد العزلات 157 عزلة بنسبة 87.2% اما العزلات الموجبة لصبغة كرام فقد بلغت 23

جدول (2) عدد العزلات السالبة والموجبة لصبغة كرام ونسبها المئوية والتي تم عزلها من خمج المجاري البولية

| النوع                       | عدد العزلات الموجبة | عدد العزلات السالبة | النسبة المئوية للعزل |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| البكتريا السالبة لصبغة كرام | 157                 | -----               | 87.2                 |
| البكتريا الموجبة لصبغة كرام | 23                  | -----               | 12.8                 |
| المجموع                     | 180                 | 20                  | 100                  |

جدول (3) أعداد الممرضات البولية المعزولة من خمج المجاري البولية ونسبها المئوية

| العزلات الجرثومية                   | عدد العزلات | النسب المئوية |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| <i>Escherichia coli</i>             | 106         | 59%           |
| <i>Klebsiella pneumonia</i>         | 36          | 20%           |
| <i>Staphylococcus aureus</i>        | 13          | 7%            |
| <i>Staphylococcus saprophiticus</i> | 10          | 5.6%          |
| <i>Pseudomonas aroginosa</i>        | 10          | 5.6%          |
| <i>Proteus mirabilis</i>            | 5           | 2.8%          |
| مجموع العينات الموجبة               | 180         | 100%          |

مقاومة البكتريا العالية جداً لكل من المضادات الحيوية Naldic acid – Gentamicin – Cefotaxime وبنسبة 100% - 97.2% - 95.3 على التوالي فيما قاومت كل من المضادات الحيوية Augmentin – ciprofloxacin – Netilimicin وبنسبة 86.8% - 83.1% - 81.2% جدول (4) وهذا يتفق مع (13)، إذ يعود سبب المقاومة العالية لاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية وكذلك لاحتواء هذه الانواع البكتيرية على البلازميات والى تعدد ناقل مهم للجينات المسؤولة عن مقاومة المضادات الحيوية.

### اختبار حساسية بكتريا *E. coli* للمضادات الحيوية


اختبرت حساسية (106) عزلة من بكتريا *E. coli* تجاه (10) من المضادات الحيوية Naldic acid – Impinem – Ciprofloxacin – Gentamicin – Netilimicin – Amikacin – Cefotaxime – Nitrofurantion – Augmentin – Rifampicin ، حددت حساسية العزلات اعتماداً على قطر منطقة التثبيط المحيط بأقراص المضادات ومقارنتها بأقطار التثبيط القياسية. تبين من النتائج التي تم الحصول عليها

جدول ( 4 ) يبين النسب المئوية لحساسية بكتريا *E. coli* والنسب المئوية للعزلات المقاومة للمضادات الحيوية قيد الدراسة .


| عدد العزلات ( 106 ) |          |               |          | الرمز | اسم المضاد الحيوي |
|---------------------|----------|---------------|----------|-------|-------------------|
| النسب المئوية       | الحساسية | النسب المئوية | المقاومة |       |                   |
| 0.0                 | 0        | 100           | 106      | Cx    | Cefotaxime        |
| 2.8                 | 3        | 97.2          | 103      | GEN   | Gentamicin        |
| 4.7                 | 5        | 95.3          | 101      | NA    | Naldic acid       |
| 13.2                | 14       | 86.8          | 92       | NET   | Netilimicin       |
| 16.9                | 18       | 83.1          | 88       | Cip   | Ciprofloxacin     |
| 18.8                | 21       | 81.2          | 85       | Ac    | Augmentin         |
| 77.3                | 82       | 22.7          | 24       | Imp   | Impinem           |
| 33                  | 35       | 67            | 71       | RF    | Refampicin        |
| 71.7                | 76       | 28.3          | 30       | NiT   | Nitrofurantion    |
| 75.5                | 80       | 24.5          | 26       | AK    | Amikacin          |

أظهرت النتائج وجود عزلة واحدة حاملة لهذا الجين (شكل 1) عند استخدام الدنا الكروموسومي في تقنية التضاعف البلمرة المتسلسل بينما أظهرت النتائج احتواء ثلاث عزلات على هذا الجين محمولاً على البلازميد (شكل 2) أشار (15) الى ان الجين المشفر للهيموليسين عادة ما يكون محمولاً على الكروموسوم بعكس عدد من الجينات مقاومة المضادات الحيوية التي غالباً ما تكون محمولة على البلازميدات. لذا فأن انتقال عامل الضراوة الهيموليسين من بكتريا *E. coli* اقلياً ما بين الانواع حالة نادرة وهذا ما لا يتفق مع النتائج المستحصلة من هذا البحث. أشار (16) الى وجود جين الهيموليسين محمولاً على بعض البلازميدات المحتواة في بعض أنواع بكتريا *E. coli* وعند مقارنة وتحليل التسلسل الخاص بهذا الجين تبين انه لا يتطابق مع جين الهيموليسين المحمول على كروموسوم *E. coli* وقد عزى هذا الباحث تلك النتيجة الى انتقال بلازميدات حاملة لهذا الجين اقلياً من بعض انواع البكتريا المعوية مثل *Enterobacter Cloacae* حيث تتميز الانواع التابعة للعائلة المعوية بقابليتها على الاقتران فيما بينها ويمكن للبلازميدات ان تنتقل بهذه الطريقة فيما بين الانواع وهذا التفسير يتطابق مع ظهور نتيجة الجين عند استخدام الدنا البلازميدي لبعض العينات في هذا البحث

**الكشف عن عامل الضراوة الهيموليسين *Haemolysin***  
يعتبر الهيموليسين احد أهم عوامل الضراوة لبكتريا *E. coli* التي تصيب الانسان وتحديداً الصنف المسبب للأسهال الدموي أو الصنف المسبب لالتهاب المجاري البولية. يعتبر الهيموليسين عامل سمية لعدد من الخلايا الدموية البيضاء وكريات الدم الحمراء وخلايا النسيج البطاني الداخلي حيث يرتبط بروتين الهيموليسين بمجسات على اسطح هذه الخلايا ثم ينغرس الى داخل الخلايا مؤدياً الى تحللها. تمت دراسة آلية عمل الهيموليسين كعامل ضراوة من قبل (14) . حيث اوضح ان الهيموليسين يعمل على استهداف المايكروندريا الخلوية مسببا حالة الموت المبرمج Apoptosis لخلايا النسيج البطاني الداخلي يشفر لعامل الهيموليسين اوبرون متكون من خمسة جينات يتحكم في تشفيرها او عملها مشغل واحد. تتميز الكائنات بدائية النواة ومنها البكتريا بأنها تقوم بتنظيم التعبير الجيني من خلال ربط عدد من الجينات المسؤولة عن عمل معين او فعل معين بمشغل واحد ويسمى هذا الترتيب بالعنقود. تمت دراسة احتواء البكتريا على عامل الهيموليسين من خلال تضاعف البلمرة التسلسلي حيث تم اعتماد الجين *Hyla* لدراسة هذه الحالة حيث تم اعتماد بادئ متخصص ينتمي الى هذا الجين وعند احتواء البكتريا على هذا الجين فأن النتيجة ستظهر بوجود حزمة دان وزن جزيئي 1117 زوج قاعدة.



الشكل(1): نتيجة الترحيل الكهربائي لنتيجة تضاعف البلمرة التسلسلي لجين *hlyA* لعينات الدنا الجينومي. تظهر الصورة وجود الجين في العزلة رقم 7 وخلوه من باقي العزلات. كان تركيز الأكاروز المستخدم 1% والعزلية 7 عزلت لكل 1سم طول، ووقت الترحيل ساعة ونصف، وقد تم استخدام بروميد الأنيديوم لتصبغ الدنا.



الشكل (2): نتيجة الترحيل الكهربائي لنتيجة تضاعف البلمرة التسلسلي لجين *hlyA* لعينات الدنا البلازميدي. تظهر الصورة وجود الجين في العزلات 3 و6 و7 وخلوه من باقي العزلات. كان تركيز الأكاروز المستخدم 1% والعزلية 7 عزلت لكل 1سم طول، ووقت الترحيل ساعة ونصف، وقد تم استخدام بروميد الأنيديوم لتصبغ الدنا.

## References

1. Stapleton, Ann (2005). Novel Mechanism of p- Fimbriated *E. coli* Virulence in Pyelonephritis . *J.am.soc.nephrol.* 16:3458-3460.
2. Al – Begat , Saad Taha Mutlk Hmidon ( 2007 ) . Study of most common aerobic bacteria causing lower urinary tract infection ( UTI) in Ramadi general hospital . thesis , college of medicine – university of Al – Anbar .
3. Emody ,I, Kereny M. and Nagy G.(2003) .Virulance factor of uropathogenic *E. coli* . *antimicrob . agents .* 22 ( suppl 2) : 29 – 33
4. Brooks , g , butel , j and morse , s .(2007 ) . *jawetz , melnick and ad elberg's medical microbiology , 4<sup>th</sup> ed . macGraw hill co . Newyork : 151-152 .*

5. Niocle, L.E. (feb 2008) Uncomplicated Urinary tract infection in adults including uncomplicated pyelonephritis. Urologic clinics of north America. 35 (1)
6. Hooten, T.M. (2000). Pathogenesis of urinary tract infection: an Update. J. Antimicro. Chemo. 45, (Supplment) : 1-7
7. Gary , C.F.(2006 ) . Urinary tract infection during pregnancy . American Academy of family physicians . Williams obstetrics 22 ed . Ch . 48 .
8. Kadir , Dr .Mohammed , Majida N. Ibrahim and Najeeba M. Salih (2010).Prevalence of Urinary Tract Infections in Patients with Renal stones .Kirkuk
9. Magdy m. Afifi . (2013) . D etection of extended spectrum Beta- lactamase producing *Klebsiella pneumonia* and *Escherichia coli* of environmental surfaces at upper Egypt International journal of Biological chemistry; 10:3923 .
10. Wult, B. G. Bergsten ,H. Connel ,P.R.Ollqno (2000).P. fimbriae enhance the early establishment of *E . coli* in the human urinary tract ,mol .microbiology ,38:456-464.
11. Brooks , g. f , Butal , j .s. and Morse , S.A. ( 2001 ) . " jawetz , melnick & abelbergs medical microbiology " . 22<sup>nd</sup> ed , lange medical books / McGraw – Hill inc , U.S.A .
12. Bartolon . A.i , L. Pallecchi, E. Riccobono , A. Mantella , D. Magnelli, T. Di Maggio , A. L. Villagran , Y. Lara, C. Saavedra ,M. Strohmeier , F. Bartalesi , C. Trigo and G. M. Rossolini . (2013) . Relentless increase of resistance to fluoroquinolones and expanded spectrum cephalosporins in *Escherichia coli*: 20 years of surveillance in resource-limited settings from Latin America. J Clinical Microbiology and Infection; 19: 356-361.
13. MAcfaddin, J.E. (2000) individual biochemical test. In: Biochemical test for identification of medical bacteria (3rded) Macfaddin J. E. (ed.) p:27-439. Lioncott Williams & wilkins Co. Blatimore. U.S.A.
14. MartinaBielaszewska, Christian Rüter, Lisa Kunsman, LiloGreune, Andreas Bauwens, Wenlan Zhang, Thorsten Kuczius, KwangSik Kim, Alexander Mellmann, M. Alexander Schmidt, HelgeKarchPLoSPathog. 2013 .
15. Koronakis V, Hughes C, 2002. Hemolysin. In Donnenberg MS (ed.), *Escherichia coli: virulence mechanisms of a versatile pathogen*. Academic Press. San Diego, Calif. pp. 361-378
16. Al – khozai , Ziad M . ( 2009 ) . Studying the adhesion properties of *Pseudomonas aeruginosa* and *staphylococcus aureus* on contact lenses and the effect of radiation with electrons and positrons on its adhesion in the laboratory , Journal of Karbala university . vol7 , no1:34- 39 .

## Biological study for virulence factor Haemolysin A in *E. coli* Bacteria Causes urinary tract infection.

Hassan Helal Rashed      Laith Muslih Najeeb  
E.mail: [dean\\_coll.science@uoanbar.edu.iq](mailto:dean_coll.science@uoanbar.edu.iq)

### Abstract:

This study was carried out to isolated and diagnoses *E. Coli* bacteria case infection of the urinary tract also study virulence factor Haemolysin A in the isolated more than resistance to antibiotic. This aim of the study 200 sample of urinc were collected from patients in Ramadi teaching hospital (male and female) of different age (one year – 70 years). the *E. Coli* bacteria were the most spreading type in the case of urinary tract infection since they were isolated with percentage 59% out the total number of bacterial isolates, indentification the disc diffusion method was used test the isolate towards (10) ten antibiotics this work also includes the study of some virulenece factor of isolated bacteria. The result revealed that a high ratio of bacteria which are gram negative *E. Coli* isolated from urinary tract infection showed high resistance to the antibiotic particularly cefotaxim 100%. Naldic acid 95.3% Gentimicin 97.2%. ten isolated were chosen from each bacteria types for the sake of studying their genetics homogeneity. DNA was extracted from ten isolated of each of the following bacteria *E. coli* this extracted DNA was used in multiplex (PCR) technique by using gen of Haemolysin. A. This result found one colony this carries the gen (Hyl A\_ number (7) to DNA genome sample. While the other result fond (Hyl A) for plasmid DNA in the samples (3 -6- 7).